



## PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID – 19 N° 015/2022 “IDENTIFICACIÓN DE CASOS Y MEDIDAS SANITARIAS”

### PRESENTACIÓN:

En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia generada por COVID 19, los establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular debiendo adaptarse a nuevas medidas necesarias para prevenir y actuar frente a posibles contagios de COVID 19.

### OBJETIVO DEL PROTOCOLO:

Definir tipos de casos COVID de acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria, evitar la propagación del virus y establecer las medidas a adoptar para cada situación.

Las definiciones y las medidas a adoptar son las siguientes:

DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Caso Sospechoso	a.- Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 hrs.)	Debe realizarse PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.
	b.- Persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.	
Caso Probable	Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID -19.	Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.
Caso Confirmado	a.- Persona con una prueba de PCR para SARS – COV -2 positiva. b.- Persona con una prueba de PCR para SARS – COV -2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado para la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. c.- Persona que resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado	Dar aviso de su condición a la Inspectora General ó al Director. Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. Personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin



	fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud.	fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o toma la de muestra.
Persona en Alerta Covid – 19	Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o con un uso incorrecto, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de los síntomas o de la toma de muestra.	Realizarse un examen confirmatorio de PCR o prueba de detección de antígenos en un centro habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con la persona contagiada. Si la persona tiene síntomas el examen debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con la persona contagiada. Debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.
Contacto Estrecho	En caso de confirmarse un brote, corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser Contacto Estrecho.	Las determinará la autoridad sanitaria.
Brote	Se considerará un brote cuando si hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.	

#### Medidas para funcionarios o docentes:

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID – 19, deberá cumplir con el aislamiento establecido en la definición de casos.

Cuando se presenten 2 o más casos de funcionarios confirmados o probables, se estará frente a un brote laboral, es este caso la SEREMI de Salud realizará las acciones establecidas para la trazabilidad de casos confirmados y probables en trabajadores y contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados.

---

Síntoma cardinal: fiebre desde 37,8° C., pérdida brusca y completa del olfato y pérdida brusca del gusto.

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar, dolor muscular, debilidad o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos y/o dolor de cabeza.